

| Dosis Recomendada | | Roundup ControlMax (kg/ha) | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Nombre vulgar | Nombre científico | ²⁻³ V Tem | ⁴ V Avan |
| ¹ Lagunilla | <i>Alternanthera phyloxeroides</i> | 2,0 | 2,4 |
| Yuyo colorado | <i>Amaranthus quitensis</i> | 1,3 | 1,8 |
| Altamisa | <i>Ambrosia tenuifolia</i> | 1,6 | 2,0 |
| Apio cimarrón | <i>Ammi majus</i> | 1,6 | 1,7 |
| No me olvides | <i>Anagallis arvensis</i> | 1,7 | 2,0 |
| Malva | <i>Anoda cristata</i> | 1,7 | 2,0 |
| ¹ Yuyo San Vicente | <i>Artemisia annua</i> | 2,0 | 2,4 |
| Avena guacha | <i>Avena fatua</i> | 1,4 | 1,8 |
| Amor seco | <i>Bidens pilosa</i> | 1,4 | 1,9 |
| Perejilillo | <i>Bowlesia incana</i> | 1,7 | 2,0 |
| Nabo | <i>Brassica campestris</i> | 1,7 | 2,0 |
| Cebadilla Criolla | <i>Bromus catarticus</i> | 1,3 | 1,8 |
| Bolsa del pastor | <i>Capsella bursa pastoris</i> | 1,6 | 1,8 |
| ¹ Cardo chileno | <i>Carduus acanthoides</i> | 1,8 | 2,4 |
| Quínoa | <i>Chenopodium album</i> | 1,3 | 1,8 |
| ¹ Cardo negro | <i>Cirsium vulgare</i> | 1,6 | 2,4 |
| Rama negra | <i>Conyza bonariensis</i> | 1,7 | * |
| Mastuerzo | <i>Coronopus didymus</i> | 1,3 | 1,6 |
| ¹ Zapallito amargo | <i>Cucurbita andreana</i> | 1,8 | 2,4 |
| ¹ Cardo de castilla | <i>Cynara cardunculus</i> | 2,0 | 2,4 |
| ¹ Gramón | <i>Cynodon dactylon</i> | 2,0 | 2,8 |
| ¹ Chufa | <i>Cyperus esculentus</i> | 2,4 | 2,8 |
| ¹ Cebollín | <i>Cyperus rotundus</i> | 2,3 | 2,8 |
| Chamico | <i>Datura ferox</i> | 1,7 | * |
| Pasto cuaresma | <i>Digitaria sanguinalis</i> | 1,3 | 1,8 |
| ¹ Pelo de chancho | <i>Distichlis spicata</i> | 1,7 | 2,5 |
| Capin | <i>Echinochloa colona</i> | 1,3 | 1,8 |
| Capín Arróz | <i>Echinochloa crus-galli</i> | 1,3 | 1,8 |
| Pata de ganso | <i>Eleusine indica</i> | 1,4 | 1,9 |
| ¹ Caraguatá | <i>Eryngium sp.</i> | 2,2 | * |
| Lecheron | <i>Euphorbia dentata</i> | 1,7 | * |
| Fique | <i>Flaveria bidentis</i> | 1,8 | 2,0 |
| ¹ Hinojo | <i>Foeniculum vulgare</i> | 2,0 | 2,7 |
| Flor de pajarito | <i>Fumaria sp.</i> | 1,6 | 2,0 |
| ¹ Alfalfa inglesa | <i>Galega officinalis</i> | 2,0 | 2,4 |
| Albahaca silvestre | <i>Galinsoga parviflora</i> | 1,3 | 1,6 |
| Vira - vira | <i>Gamochoaeta spicata</i> | 1,6 | 2,0 |
| Ortiga mansa | <i>Lamium amplexicaule</i> | 1,6 | 2,0 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| Raigrás anual | <i>Lolium multiflorum</i> | 1,3 | 1,8 |
| ¹ Raigrás perenne | <i>Lolium perenne</i> | 1,6 | 2,1 |
| Manzanilla | <i>Matricaria chamomilla</i> | 1,6 | 2,0 |
| Farolito | <i>Nicandra Physalodes</i> | 1,6 | 2,0 |
| Palan palan | <i>Nicotiana glauca</i> | 1,8 | * |
| ¹ Paja colorada | <i>Paspalum quadrifarium</i> | 1,7 | 2,8 |
| ¹ Siete venas | <i>Plantago lanceolata</i> | 2,0 | 2,4 |
| ¹ Llanten | <i>Plantago major</i> | 2,0 | 2,4 |
| Pasto de invierno | <i>Poa annua</i> | 1,3 | 1,8 |
| ¹ Cien nudos, Sanguinaria | <i>Polygonum aviculare</i> | 1,3 | 2,0 |
| Enredadera anual | <i>Polygonum convolvulus</i> | 1,3 | 2,0 |
| Verdolaga | <i>Portulaca oleracea</i> | 1,7 | 2,4 |
| Nabón | <i>Raphanus sativus</i> | 1,7 | 2,0 |
| Mostacilla | <i>Rapistrum rugosum</i> | 1,7 | 2,0 |
| ¹ Lengua de vaca | <i>Rumex crispus</i> | 2,0 | 2,4 |
| Cardo Ruso | <i>Salsola kali</i> | 1,7 | 2,2 |
| ¹ Primavera | <i>Senecio grisebachii</i> | 2,0 | 2,4 |
| ¹ Barabal | <i>Setaria geniculata</i> | 1,6 | 2,4 |
| Pega-pega | <i>Setaria verticillata</i> | 1,3 | 1,8 |
| ¹ Afata, Escoba dura | <i>Sida rhombifolia</i> | 2,0 | 2,4 |
| ¹ Cardo asnal | <i>Silybum marianum</i> | 1,6 | 2,4 |
| ¹ Revienta Caballos | <i>Solanum sisymbriifolium</i> | 2,0 | 2,4 |
| Cerraja | <i>Sonchus oleracus</i> | 1,7 | * |
| ¹ Sorgo de alepo | <i>Sorghum halepense</i> | 1,4 | 2,2 |
| Caapiquí | <i>Stellaria media</i> | 1,4 | 2,0 |
| ¹ Pasto puna | <i>Stipa brachichaeta</i> | 1,7 | 2,5 |
| Chinchilla | <i>Tagetes minuta</i> | 1,6 | 1,8 |
| ¹ Tricloris | <i>Trichloris pluriflora</i> | 2,2 | * |
| Pasto bandera | <i>Urochloa platyphylla</i> | 1,6 | 2,0 |
| Ortiga | <i>Urtica urens</i> | 1,7 | 2,0 |
| Verónica | <i>Veronica persica</i> | 1,3 | 1,8 |
| Pensamiento silvestre | <i>Viola arvensis</i> | 1,6 | 2,2 |
| ¹ Sunchillo | <i>Wedelia glauca</i> | 2,3 | * |
| Abrojo grande | <i>Xanthium cavanillesii</i> | 1,6 | 2,0 |
| Abrojo chico | <i>Xanthium spinosum</i> | 1,6 | 2,0 |

Referencias

¹. Dosis orientativa para perennes y bienales, no excluyen la necesidad de reaplicaciones posteriores.

². Pueden requerir una segunda aplicación sobre cultivos Roundup Ready®, entre 0,8 y 1,0 kg/ha de Roundup ControlMax®.

³. Plantas de hasta 8 - 10 cm de altura o diámetro para control con Roundup Full® II.

⁴. Plantas de más de 8-10 cm de altura o diámetro hasta previo a la aparición de la primera flor.

* Debe ser agregado al Roundup®, un herbicida complementario para su control.

V Temp Estadio vegetativo temprano

V Avan Estadio vegetativo avanzado